

30 EJERCICIOS de MATRICES

1. Hallar x e y para que ambas matrices sean iguales: $\begin{pmatrix} 1 & -2 & x & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 7 & 3 & 0 \\ y & 2 & 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$
2. Indicar tres ejemplos de matriz simétrica de orden 3

■ Operaciones con matrices:

3. Dadas: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 5 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 & 0 \\ 1/2 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

hallar: a) $A+B$ b) $-B$ c) $A-B$ d) $2C$ e) $-3A$ f) $A+3B-4C$

☛ *Ejercicios libro: pág. 52: 1 (comprobación de las propiedades de $\lambda \cdot A$)*

4. Dadas: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$

hallar: a) $A \cdot B$ b) $B \cdot A$ c) $A \cdot C$ d) $C \cdot A$ e) $B \cdot C$ f) $C \cdot A$ g) B^2 h) A^2 i) $B \cdot B^t$ j) B^3

5. Dada una matriz A , ¿existe una matriz B , tal que el producto AB , o bien el BA , sea una matriz de una sola fila? Indicar ejemplos.
6. Comprobar si existe una matriz B tal que el producto AB sea una matriz de tres filas, siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

7. Dadas las siguientes matrices: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

escribir los productos AB y BA .

8. El producto de dos matrices diagonales es otra matriz diagonal. Comprobarlo para dos matrices de orden 3.

☛ *Ejercicios libro: pág. 55: 2; pág. 61: 3 a 10; págs. 72 y ss.: 1 a 9, 21, 22, 32, 34, 35 y 36 (operaciones con matrices)*

9. Resolver la ecuación matricial siguiente e indicar la dimensión de la matriz X :

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 2X = 3 \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

10. Calcular $A^2 - 3A - I$, siendo $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

11. Demostrar que la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ satisface la relación $A^n = 2^{n-1} A$

12. Calcular, por inducción, las potencias n-ésimas de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1/7 & 1/7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

13. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, se pide: a) Calcular A^2 , A^3 y A^4 , deduciendo una fórmula general para A^n
b) Demostrar que la fórmula anterior también es válida para A^{n+1}
c) ¿Cuánto valdría A^{99} ?

14. (S) Calcular A^2 , A^3 y A^{428} dada la siguiente matriz: $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -1 \\ -3 & -4 & 1 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ (Solución: $A^{428} = A^2$)

15. (S) Comprobar que la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ verifica la relación $A^2 + I = 0$. Obtener una matriz $B_{2 \times 2}$, distinta de $\pm A$, que también verifique la relación $B^2 + I = 0$.

16. (S) Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, determinar, si es posible, un valor de λ para el que la matriz $(A - \lambda I)^2$ sea la matriz nula. (Solución: $\lambda = 1$)

17. (S) Determinar los valores de x , y , z para que se verifique la igualdad

$$\begin{pmatrix} 1 & y \\ x & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

(Soluc: hay cuatro soluciones posibles: $-2, 2, 1$; $2, 2, -1$; $2, -2, 1$; $-2, -2, -1$)

18. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$, encontrar la expresión general de la matriz $B = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ tal que el producto de ambas conmute. (Soluc: $B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$)

19. Hallar la forma general de las matrices X que conmutan con $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (Soluc: $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$)

20. a) Encontrar dos matrices X e Y que cumplan:

$$\left. \begin{aligned} 2X + Y &= \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ X - Y &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\}$$

b) Ídem con

$$\left. \begin{aligned} 2X - 3Y &= \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \\ X - Y &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\}$$

21. Calcular x, y, z, t para que se cumpla que $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ (Soluc: $\begin{pmatrix} 5/2 & 3/2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$)

☛ **Ejercicios libro:** pág. 72: 10 a 15 (ecuaciones y sistemas sencillos con matrices)

■ Operaciones con datos en tablas y grafos:

22. En un centro de estudios de idiomas los alumnos de francés y alemán se distribuyen en 4 niveles como indica la matriz **A**. Los precios que pagan los alumnos por hora de clase dependen del nivel en que se encuentren y de que el aula disponga o no de puestos de laboratorio de idiomas, según figura en la matriz **B**. Calcular lo que percibiría este centro educativo por hora de cada idioma impartido dependiendo de que las aulas estén o no dotadas de los medios mencionados.

$$A = \begin{matrix} & \text{FR.} & \text{AL.} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 12 & 16 \\ 10 & 11 \\ 15 & 11 \\ 10 & 7 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{sin lab.} \\ \text{con lab.} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 5 & 5,5 & 8 & 10 \\ 7 & 7 & 10 & 12 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(Soluc: haciendo BA obtenemos FR sin lab=33,5 €, FR con lab=42,4 €, AL sin lab=29,850 € y AL con lab=38,3 €)

23. Una factoría produce encendedores P_1 , rotuladores P_2 , y llaveros P_3 , para cuya elaboración se precisan materias primas como gas M_1 , tinta M_2 , plástico M_3 y metal M_4 . Dos compañías distribuidoras D_1 y D_2 se encargan de proporcionar a los comercios estos productos. Sea:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} D_1 \\ D_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1000 & 650 & 400 \\ 1000 & 600 & 350 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

la matriz de pedido de los tres productos por parte de los distribuidores,

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} M_1 & M_2 & M_3 & M_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 10 & 0 & 40 & 10 \\ 0 & 20 & 60 & 0 \\ 0 & 0 & 30 & 30 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

la matriz que expresa la cantidad de cada una de las materias primas, en gramos, por unidad de cada producto, y

$$C = \begin{matrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ M_4 \end{matrix} \begin{matrix} K \\ \left(\begin{matrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

la matriz de costes por gramo de cada material. ¿Qué materias primas forman parte de los llaveros, y en qué cantidades por unidad producida? Calcular e interpretar el significado de **AB**, **BC** y **ABC**.

(Soluc: en cada llavero hay 30 gr. de plástico y 30 gr. de metal; **AB** expresa la cantidad total de cada materia prima que precisa cada distribuidora; **BC** es la matriz de costes de cada producto; **A BC** expresa los beneficios que obtiene cada distribuidora)

24. Las velocidades medias de tres coches *A*, *B*, *C* en km/h, vienen dadas por la matriz

$$V = \begin{pmatrix} 50 \\ 80 \\ 120 \end{pmatrix}$$

El número de horas que cada coche viaja viene dado por la matriz $H = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$. Calcular los productos HV y VH , interpretando los valores de los términos de las matrices resultantes.

(Soluc: el único término de HV representa el total de kms. recorridos por los tres coches; cada término de VH representa los kms. recorridos por el coche a la velocidad que indica la fila en que está situado viajando el número de horas que indica la columna)

25. Se realiza una comparación del precio de cuatro productos en tres supermercados distintos. Los precios por kg de los productos en los distintos supermercados vienen dados por la matriz

$$\begin{matrix} \text{Verdura} \\ \text{Carne} \\ \text{Pan} \\ \text{Fruta} \end{matrix} \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ \left(\begin{matrix} 8 & 9 & 10 \\ 40 & 50 & 40 \\ 4 & 4 & 3,5 \\ 12 & 15 & 14 \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

El número de Kg comprados respectivamente de cada producto está dado por la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Mediante el producto apropiado de matrices, comparar el coste del total de la compra en los tres supermercados.

(Soluc: la matriz del coste total de los productos es $(164 \ 202 \ 171,5)$)

26. El consumo anual medio en litros de leche desnatada, semi y entera de tres familias F_1 , F_2 y F_3 viene dado por la siguiente matriz:

$$A = \begin{matrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{matrix} \begin{matrix} \text{desn} & \text{semi} & \text{entera} \\ \left(\begin{matrix} 430 & 157 & 8 \\ 545 & 210 & 1 \\ 120 & 80 & 3 \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

mientras que la evolución de los precios en € de tales productos en los últimos años es:

$$B = \begin{matrix} \text{desn} \\ \text{semi} \\ \text{ent} \end{matrix} \begin{pmatrix} 2006 & 2007 & 2008 & 2009 \\ 80 & 83 & 90 & 92 \\ 83 & 87 & 88 & 90 \\ 85 & 88 & 90 & 95 \end{pmatrix}$$


Calcular e interpretar $A \cdot B$ (Soluc: Representa el gasto anual de cada familia en leche)

27. Una cooperativa farmacéutica distribuye un producto en tres tipos de envases A, B y C, cuyos precios y pesos son los de esta tabla:

	Peso (g)	Precio (€)
A	250	1
B	500	1,80
C	1000	3,30


A una farmacia se le ha suministrado 5 envases con un peso total de 2,5 kg por un importe de 8,90 €. ¿Cuántos envases de cada tipo ha comprado la farmacia? (Obligatorio utilizar matrices).

28. Para viajar de P a R no hay vuelo directo, sino que hay que hacer escala en alguno de los cuatro aeropuertos de la ciudad Q, según el siguiente grafo:




Construir la matriz fila que representa los vuelos de P a Q_i y la matriz columna de los vuelos de Q_i a R. ¿Qué debemos hacer con ambas matrices para obtener el número de combinaciones de vuelos de P a R? ¿Cuántas formas hay de ir de P a R? (Soluc: Multiplicarlas; 9 formas distintas)

29. En una academia de idiomas hay 100 alumnos en 1º, 90 en 2º y 80 en 3º. Al final de curso se dan los resultados que se resumen en el siguiente grafo:



Por ejemplo, el 25% de los alumnos de 1º repite, el 60% pasa a 2º y el 5% pasa directamente a 3º (el resto abandona). Formar adecuadamente la matriz 3×3 que representa el % de alumnos que pasan a los diferentes cursos. ¿Cómo debe operarse con la matriz columna que recoge en nº de alumnos por nivel en el presente curso para obtener el nº de alumnos por nivel el próximo curso?

30. En una ciudad A hay tres aeropuertos A_1 , A_2 y A_3 , en B hay cuatro y en C dos. Una persona que quiera ir de A a B un cierto día de la semana, y de B a C al día siguiente, dispone de los vuelos que se recogen en el siguiente grafo:



Construir sendas matrices que representen los vuelos de A a B y de B a C. ¿Qué operación debe hacerse entre ellas para obtener el número de formas distintas de ir de A a C?

☞ **Ejercicios libro:** págs. 73 y ss.: 30 y 31 (tablas y grafos); 37 a 40, 43, 45 y 48 (teórico-prácticos)